

Wuxal Super

HNOJIVO ES

Hnojivo NPK – roztokové se stopovými živinami

Výrobce: AGLUKON Spezialdünger GmbH & Co.KG, Düsseldorf, Německo

Balí a dodává: LOVELA Terezín s.r.o., Budínek 80, 263 01 Svaté Pole, provozovna: 28. října 62, 411 55 Terezín, tel: 416 782 224

Obsah živin:

Dusík (N)	- celkový	8,0%
	- dusičnanový dusík	2,3%
	- amonný dusík	3,7%
	- močovinový dusík	2,0%
Oxid fosforečný (P_2O_5) – vodorozpustný		8,0%
Oxid draselný (K_2O) - vodorozpustný		6,0 %
Bór (B)		0,01%
Měď (Cu) v chelátu s EDTA		0,007%
Železo (Fe) v chelátu s EDTA		0,015%
Mangan (Mn) v chelátu s EDTA		0,013%
Molybden (Mo)		0,001%
Zinek (Zn) v chelátu s EDTA		0,005%

Hmotnost náplně: 1240 g

Objem náplně: 1000 ml

Rozsah a způsob použití :

Kapalné hnojivo s nízkým obsahem chloru pro použití v polních plodinách, chmelu, zelinářství, okrasných rostlinách, ovocných dřevinách, vinné révě a ve školkách. Používá se pro aplikaci jak na list, tak případně do půdy. Veškeré stopové živiny jsou v chelátové vazbě a jsou proto rostlinami snadno přijímány.

Dávkování a pokyn pro použití:

Zelinářství ve sklenících - používá se v koncentraci 0,1-0,2% (10-20 ml/10 l vody) buď samotný nebo současně s aplikací běžných pesticidů. Při ranějších růstových fázích se používá nižší hranice doporučené koncentrace.

Polní zelenina:

Okurky, rajčata, paprika – dávka 50 ml/10 l vody/100m², ošetření 2x před květem a dále 3-4x v intervalech 14 dní

Brokev, zelenina, salát – koncentrace 0,1-0,2% (10-20 ml/10 l vody), ošetření 4x, poprvé po výsadbě, poté v cca 10 denních intervalech,

Mrkev – dávka 50 ml/10 l vody /100m² doporučuje se 6 ošetření v dvoutýdenních intervalech

Cibule, melouny – dávka 50ml/10 l vody /100m², ošetřuje se 4x, poprvé měsíc po vzejití, dále v dvoutýdenních intervalech

Jahodník – ošetření se provádí 1x týdně, koncentrace 0,1-0,2% (10-20 ml/10 l vody)

Okrasné rostliny – používá se v koncentraci 0,05-0,4% (5-40 ml/10 l vody) s ohledem na druh a stáří kultury. U rostlin s měkkými, jemnými listy a u mladších rostlin se používá spodní hranice koncentrace. Hnojivo nezanechává na rostlinách skvrny, lze jej tedy bez rizika použít i těsně před sklizní. Při hydroponii se přípravek používá v koncentraci 0,005%-0,2% s ohledem na stáří a druh kultury.

Ovocné dřeviny a vinná réva – lze Wuxal používat současně s ošetřením běžnými pesticidy, koncentrace 0,3% (30 ml/10 l vody)

Polní plodiny: přípravek lze používat současně s běžnými pesticidy v dávce 50ml/10 l vody/ 100m²

Brambory – dávka 50ml/10 l vody /100m², ošetřuje se 2x před květem a 3-4x po odkvětu v intervalu cca 3 týdny

Kukuřice – dávka 50ml/10 l vody /100m², ošetřuje se 4x, poprvé při výšce rostlin 15-25 cm, poté ve dvoutýdenních intervalech

Školky ovocných a okrasných dřevin - v nejmladších růstových stádiích (po vytvoření prvních listů) postřik nebo zálivky v konc. 0,1%, později 0,2%. Při zálivce zmlžováním lze pokaždé Wuxal Super přidat v koncentraci 0,05%. V pozdějších vývojových stádiích lze Wuxal Super v koncentraci 0,2% používat i při aplikacích všech běžně používaných pesticidů.

Příprava aplikačního roztoku:

Hnojivo je potřeba v obalu nejdříve pečlivě rozmíchat a poté se vlije přes sítko do nádrže a spláchně vodou. Při přípravě směsi s pesticidy se do nádrže vždy vpraví jako první Wuxal a teprve poté se předepsaným postupem dávákuje příslušný pesticid.

Mísitelnost:

Wuxal Super je fyzikálně a chemicky mísitelný s fungicidy a insekticidy, běžně se nacházejícími na trhu. Nedoporučujeme jej používat ve směsi se silně alkalickými postřiky typu Bordeauxské nebo sírovápenaté jichy a s polysulfidy. Před prvním provozním ošetřením okrasných rostlin směsí Wuxalu s pesticidy doporučujeme ověřit citlivost kultury k této směsi v daných místních podmínkách.

Pokyn pro skladování a manipulaci:

Hnojivo skladujeme v uzavřených originálních obalech v suchých, čistých, uzamčených a chladných skladech odděleně od potravin, nápojů a krmiv, kyselin, louhů, olejů a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, teplotami pod +5 a nad 30 °C, před vlhkem a mechanickým poškozením. Krátkodobým vystavením výrobku teplotám pod +5 °C může dojít ke změně barvy a vyloučení krystalů. Tato skutečnost není na záadu jakosti, při přepravě aplikační kapaliny dojde ke snadnému rozpuštění krystalů. Krystaly lze rovněž rozpustit delším ponecháním výrobků při teplotách okolo 20 °C za občasného promíchání či protřepání. Nutno zabránit vyschnutí přípravku – v krystalickém stavu v kontaktu s hořlavými látkami podporuje hoření a může zapříčinit výbuch.

Způsob likvidace obalů:

Obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru druhotných surovin

Datum výroby číslo šarže je uvedeno na obalu

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při skladování v původních obalech