

## PŘÍBALOVÝ LETÁK

**Působení:** VitiSan je kontaktní fungicid s preventivním i kurativním účinkem proti houbovým patogenům. Po aplikaci dochází k narušení a následnému vysušení původců choroby (mycelia) a zamezení klíčení spor. Tak je zabráněno další infekci. Pro dobrou účinnost je důležité dosáhnout souvislého pokrytí porostu.

Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování, mísitelnost	OL (dny)	Poznámka
réva	padlí révové	0,75%, (75 g/10 l vody)	AT	Max. počet aplikací 6x v intervalu 3 – 7 dnů postřik, rosení do počátku skanutí

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

**Rozsah rozšířeného použití dle čl. 51 nařízení: Menší použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009**

Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování, mísitelnost	OL (dny)	Poznámka
réva	plíseň šedá	2% (200 g /10 l vody)	AT	Max. počet aplikací 6 x za rok, interval mezi aplikacemi 3-7 dnů; postřik, rosení do počátku skanutí, ošetřuje se pouze zóna hroznů
jabloň	strupovitost jableň	0,75% (75 g /10 l vody)	1	Max. počet aplikací 6 x za rok, interval mezi aplikacemi 8-10 dnů; postřik, rosení do počátku skanutí
drobné ovoce	americké padlí angreštové	0,5% (50 g /10 l vody)		Max. počet aplikací 8x v intervalu 7-10 dnů postřik, rosení do počátku skanutí
čekanka salátová, kozlíček polníček	padlí	30 g 6 l vody/ 100 m <sup>2</sup>		Max. počet aplikací 10x v intervalu 5-7 dnů postřik, rosení do počátku skanutí
okrasné rostliny	padlí	30 g 10-20 l vody/100 m <sup>2</sup>	AT	Max. počet aplikací 10 x, interval mezi aplikacemi venkovní prostory 7-10 dnů, chráněné prostory 5-7 dnů; postřik, rosení
tykev	padlí	15-30 g 6-12 l vody/100 m <sup>2</sup>	1	Max. počet aplikací 6 x, interval mezi aplikacemi 7-10 dnů; postřik, rosení
kořeninové rostliny a koření	padlí	30 g 4-6 l vody/100 m <sup>2</sup>		Max. počet aplikací 6 x, interval mezi aplikacemi 7-10 dnů; postřik, rosení
rajče	padlí	15-30 g 6-12 l vody/100 m <sup>2</sup>		Max. počet aplikací 6 x, interval mezi aplikacemi 7-10 dnů; postřik, rosení
jahodník	padlí	30 g 5-10 l vody/100 m <sup>2</sup>		Max. počet aplikací 8 x, interval mezi aplikacemi 7-10 dnů; postřik, rosení

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

OL – (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní

### Převodní tabulka pro odměření přípravku:

Množství přípravku v gramech	ml na odměrce
10 g	6,5 ml
15 g	11 ml
30 g *	22 ml

\* Množství 30 g odpovídá jedné odměrce po horní rysku

Pokud se snižuje dávku aplikační kapaliny v rámci doporučeného rozmezí v révě, rajčatech a tykvích, snižuje se úměrně dávku přípravku na jednotku ošetřené plochy tak, aby byla zachována koncentrace.

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

**SP1** Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/ Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest)

**SPo 5** Před opětovným vstupem ošetřené skleníky důkladně vyvětrejte.

**Příprava postřikové kapaliny:** VitiSan rozmíchejte ve velkém množství vody přímo v nádobě postřikovače při současném míchání a doplňování na plnou dávku vody. Postřikovou kapalinu promíchejte průběžně během aplikace.

**Čistění aplikačního zařízení:** Aplikační zařízení po ukončení práce vypláchněte čistou vodou. V případě čisticích prostředků postupujte dle návodu k jejich použití.

**Skladování:** VitiSan skladujte v původních obalech v suchých chladných místnostech při teplotě +5 až +30°C. Uchovávejte odděleně od skladovaných potravin, nápojů a krmiv. Neskladujte s kyselinami. Použitelnost 2 roky od data výroby.

Přípravek na ochranu rostlin, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbor přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu pomocného prostředku

**Likvidace obalů a zbytků:** Zbytky postřikové jichy se zředí 1:5 vodou a vystříkají na ošetřovanou plochu.

Vypláchnuté obaly mohou být likvidovány jako běžný odpad. Použité obaly se dále nepoužívají. Neupotřebitelné zbytky přípravku, resp. přípravky s prošlou záruční lhůtou se likvidují rovněž spálením ve schválené spalovně, stejně tak i kontaminované obaly.

**Bezpečnostní opatření:** Při práci s přípravkem VitiSan použijte vhodné OOPP.

Ochrana dýchacích orgánů: není nutná.

Ochrana očí a obličeje: není nutná.

Ochrana těla: ochranný oděv a nepromokavý plášť nebo turistická pláštěnka.

Dodatečná ochrana hlavy: není nutná; v případě ručního postřiku – ve výšce hlavy nebo směrem nahoru – kapuce, čepice se štítkem nebo klobouk

Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice.

Dodatečná ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holínky) s ohledem na práci v zahrádkářském terénu.

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Při práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prostředků a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Ochranný oděv vyperte, resp. důkladně očistěte ty ochranné prostředky, které nelze prát. Další požadavky při ošetřování okrasných rostlin v parcích apod.: Přípravek aplikujte v době, kdy je nejmenší pohyb dalších osob na ploše.

**Všeobecné pokyny:** Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.

**První pomoc :**

- **při nadýchání:** Přerušete práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.

- **při zasažení očí:** Vyplachujte oči čistou tekoucí vodou, nejlépe pokojové teploty a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Zasažené kontaktní čočky je třeba je zlikvidovat.

- **při zasažení kůže:** Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem.

- **při náhodném požití:** Podejte 0,5 l pitné vody. Nevyvolávejte zvracení.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402

**Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.**

**Zkuste také:**

**Lepinox® Plus** – Ochrana rostlin před škodlivými housenkami

**Alginure®** – Zvýšení odolnosti rostlin proti plísním

**Nematop®** – Parazitické hlístice proti larvám lalokonosců



**BIOCONT**  
LABORATORY