


PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘILOŽENÝ NÁVOD K POUŽITÍ.

Multirose

Kombinovaný insekticidní a fungicidní přípravek ve formě suspenze emulze určený k ochraně růží a dalších okrasných rostlin proti savým a žravým škůdcům a proti houbovým chorobám.
Pro neprofesionální použití.



Multirose		
Název a množství účinné látky: deltamethrin 0,5 g/l (0,05 % hmot.) tebukonazol 10 g/l (1 % hmot.)		
Označení přípravku:		
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	Varování
P101	Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.	
P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.	
P391	Uniklý produkt seberte.	
P501	Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.	
EUH401	Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.	
EUH208	Obsahuje isothiazolony. Může vyvolat alergickou reakci.	
SP1	Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nechástejte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).	
OP II. st.	Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody. Zvlášť nebezpečný pro včely.	
Držitel povolení: SBM Développement S.A.S., 60 Chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Francie UFI: H4A6-4JVN-VJ0R-3WMX		

www.seazon.cz
Právní zástupce: STAPHYT s.r.o., Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4, Tel. +420 226 226 346.

Osoba odpovědná za konečné balení a označení nebo za konečné označení přípravku na ochranu rostlin na trhu: TARGET S.A., Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, Polsko

Evidenční číslo přípravku: 5225-0

Číslo šarže: uvedeno na primárním obalu

Datum výroby formulace: uvedeno primárním na obalu

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby při správném způsobu skladování v neporušených originálních obalech (teplota skladování: +5 °C až +30 °C).

Množství přípravku v obalu: 50 ml v HDPE láhvi (Balení je opatřeno odměrkou)

Způsob působení

Multirose je kombinovaný insekticidní a fungicidní přípravek - insekticidní složka působí kontaktně, fungicidní systémově. Účinkuje na mšice a na škodlivé housenky motýlů a dále působí proti houbovým chorobám (padlí, černá skvrnitost, rzi) vyskytujících se na růžích a dalších okrasných rostlinách. Je použitelný ve venkovním prostředí i ve vnitřních prostorech a ve sklenících.

Návod k použití

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, míšitelnost	OL (dnů)	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklízně
růže, okrasné rostliny	mšice, housenky, padlí, černá skvrnitost, rzi	1 % (10 ml/1 l vody)	-	2) od začátku výskytu	4) do počátku skanutí 5) venkovní prostory, vnitřní prostory, skleníky

(-) - ochrannou lhůtu není nutné stanovit

Plodina, oblast použití	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
okrasné rostliny, růže	postřik	3x	10-14 dnů

Upřesnění použití

Před ošetřením okrasných rostlin ověřte citlivost na menším počtu rostlin nebo menší ploše.

Antirezistentní strategie

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyrethroidu nebo azolu po sobě bez přerušení ošetřením jiným přípravkem s odlišným mechanismem účinku.

Další omezení

Přípravek nesmí být aplikován na porost navštěvovaný včelami. Neaplikujte na kvetoucí plodiny a na pozemky s kvetoucími plevely. Neaplikujte na místech, na nichž jsou včely aktivní při vyhledávání potravy.

Pro skleníky a uzavřené prostory

Při použití ve sklenících s opylujícími čmeláky: Zabraňte expozici čmeláků zakrytím nebo odstraněním kolonií během aplikace.

Přípravek neaplikujte ve sklenících, kde je používána biologická ochrana.

Důkladně vypláchněte obal.

Při aplikaci přípravku nesmí dojít k zasažení vodních ploch z důvodu rizika pro vodní organismy.

Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru do větru a od dalších osob.

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení ochranného oděvu a dalších ochranných prostředků a do důkladného umytí.

Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy.

Po ukončení práce ve skleníku/fóliovníku opusťte ošetřované prostory!

Opětovný vstup na ošetřené pozemek je možný po zaschnutí, ideálně však až druhý den. Ochranný oděv vyperete, resp. důkladně očistíte ty ochranné prostředky, které nelze prát. Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čocky. Přípravek uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při ošetřování okrasných rostlin, okrasných keřů, okrasných dřevin nebo aplikaci na cesty či místa s dřevinami (na neobdělávané půdě): Přípravek aplikujte vdobě, kdy je nejmenší (ideálně žádný) pohyb dalších osob na ploše.

Příprava aplikační kapaliny

Uvedeno v bodu: Další údaje a upřesnění.

Čištění zařízení pro aplikaci přípravku

Uvedeno v bodu: Další údaje a upřesnění.

Osobní ochranné pracovní prostředky

Ochrana dýchacích orgánů: není nutná.

Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice.

Ochrana očí a obličej: není nutná.

Ochrana těla: ochranný oděv a nepromokavý plášť nebo turistická pláštěnka.

Dodatečná ochrana hlavy: není nutná.

Dodatečná ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové boty) s ohledem na práci v zahradkářském terénu.

Poškozené ochranné prostředky (např. protřesené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.

Informace o první pomoci

Všeobecné pokyny: Projevil-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.	
První pomoc při nadýchání:	Přerušete práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.
První pomoc při zasažení kůže:	Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte, pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte.
První pomoc při zasažení očí:	Vyplychujte oči velkým množstvím vlahe čisté vody a současně odstraňte kontaktní čocky, jsou-li nasazený, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čocky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití:	Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v suchých a větratelých prostorech při teplotách +5 °C až +30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před vlhkem, mrazem a přímým slunečním svitem. Výrobce nepřebírá záruku za škody vzniklé nesprávným skladováním přípravku.

Likvidace obalů a zbytků

Prázdny obaly, případně zbytky přípravku, se odloží jako nebezpečný odpad, např. uložením do vyčleněných, k tomu určených kontejnerů.

Další údaje a upřesnění

Přípravku, u nichž prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že jejich chemické a fyzikální vlastnosti se shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbor přípravku pro tento účel zajistí držitel povolení u laboratoře akreditované v členském státě Evropské unie. Držitel povolení je povinen prodlouženou dobu použitelnosti vyznačit na obalu přípravku a tuto skutečnost oznámit Ústavu do 5 dnů ode dne provedení změny na obalu přípravku.

Technika aplikace

Přípravek se aplikuje ručně postřikem do počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.

Termín aplikace: od začátku výskytu škodlivého organismu; opakujte po 10-14 dnech. Ošetření je třeba provádět opakovaně pro trvalou ochranu rostlin.

U růží proti černé skvrnitosti a rzím proveďte první ošetření při vytváření listů na jaře a opakujte po 10 dnech.

Postřik neprovádějte za intenzivního slunečního svitu a v době květu. Nejlépe v poedeč nebo časně ráno.

Neprovádějte ošetření za sucha, kdy jsou suché kořeny rostlin.

Některé citlivé okrasné rostliny (zejména ve skleníku) mohou po postřiku částečně změnit barvu nebo se vytvořit skvrny, ale růst je normální a změna barvy není trvalá.

Přípravek může zanechat skvrny na poréznych površích.

V případě výskytu rezistence zejména u mšic použijte alternativní přípravek (např. Calypso AL).

Příprava aplikační kapaliny

Před použitím láhev důkladně protřepejte. Naplňte víčko po rysku 10 ml a vlijte toto množství do 1 l vody a opět důkladně promíchejte. K postřiku použijte tlakový ruční postřikovač. Postřikujte důkladně listy a stonky ze vzdálenosti 15 – 30 cm do takové míry, aby nedocházelo ke stékání (pouze do skanutí – na listech se tvoří kapky). Ošetřete celou rostlinu včetně spodní strany listů.

Čištění zařízení pro aplikaci přípravku

Postřikovač po aplikaci důkladně vypláchněte vodou (3x) a výplachovou kapalinu poté vystříkejte na naposledy ošetřovanou plochu.

Dodateková informace společnosti SBM Développement S.A.S.

Přípravek používejte výhradně v souladu s návodem k použití.

Přípravek nesmí být používán v takových dávkách a kombinacích, které nejsou uvedeny v textu etikety anebo nejsou součástí písemných doporučení společnosti SBM Développement S.A.S., platných pro aplikaci dodávaných přípravků na ochranu rostlin.

V případě použití jakékoliv kombinace předem odzkoušejte vzájemnou míšitelnost jednotlivých zamýšlených složek.

Společnost SBM Développement S.A.S. nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím či skladováním přípravku.

