

Dodatečná ochrana hlavy při aplikaci výše hlavy nebo směrem nahoru: kapuce, čepice se štítkem nebo klobouk v ostatních případech není nutná

Dodatečná ochrana nohou uzavřená obuv (s ohledem na práci v terénu)

Společný údaj k OOP poškozené OOP (např. protřžené rukavice) je třeba vyměnit.

Informace o první pomoci:

Všeobecné pokyny:

Projevili-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.

První pomoc při nadýchání aerosolu:

Přerušete práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast. Nebo dopravte postiženého mimo ošetřovanou oblast. Zajistěte tělesný i duševní klid.

První pomoc při zasažení kůže:

Odložte nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte vodou a mydlem, pokožku následně dobře opláchněte.

První pomoc při zasažení očí:

Vyplachujte oči velkým množstvím, pokud možno vlažné čisté vody. Má-li osoba kontaktní čočky, vyjměte je, pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.

První pomoc při náhodném požití:

Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o pomocném prostředku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování:

Pomocný prostředek skladujte v uzavřených originálních obalech při teplotách +5 °C až +30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, sálavým teplem, otevřeným ohněm a přímým slunečním světlem.

Likvidace obalů a zbytků:

Obal pomocného prostředku se nesmí znovu použít k jakémukoliv účelu. Aplikáční kapalinu připravujte vždy jen v nezbytně nutném množství, nikoliv do zásoby. Neupotřebitelné zbytky pomocného prostředku (vždy v originálním obalu), resp. pomocný prostředek s prošlou záruční lhůtou se likvidují jako nebezpečný odpad, např. předáním na sběrný dvůr do části nebezpečný odpad. Použité obaly lze po vymytí předat jako plast k recyklaci nebo mohou být likvidovány jako běžný odpad. Případné zbytky oplachové kapaliny nebo postřikové jíchy se navedl 1:5 vodou a bezzbytku vystřikají na ošetřovaném pozemku, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipienty povrchových vod.



Další údaje a upřesnění:

Jednací číslo povolení:

UKZUZ 032764/2024

Výrobce pomocného prostředku:

AGRO CS a.s., provozovna Bezděkov 13,
535 01 Přelouč, tel.: 466 972 292

Balí:

AGRO CS a.s., provozovna Bezděkov 13,
535 01 Přelouč, tel.: 466 972 292

Dodává:

AGRO CS a.s., č.p. 265, 552 03 Říkov, tel: 491 457 111

Další upřesnění použití:

Rock Effect NEW je na přírodní bázi, proto zákal či malá usazenina není na závadu a neovlivní účinnost prostředku. **Vyhnete se aplikaci za prudkého slunce a vysokých teplot (nad 26 °C) zejména ve sklenících.** Rock Effect NEW působí kontaktně, proto je pro dobrou účinnost nutné ošetřit části rostlin, kde se škůdci nachází (zejména rub listů rostlin). Pro optimální účinnost je nutné aplikovat při zjištění prvního výskytu škůdců. **U prostorových kultur ukončíte postřik či rosení při dokonalém ovhnutí, nejpozději při počínajícím skanutí aplikáční kapaliny z povrchu ošetřovaných částí rostlin.** Ošetření opakujeme dle počasí (po smytl ochranného filmu deštěm, rosou, na nové přírůstky rostlin, po odeznění účinnosti...), dále dle ohrožení porostu a opětovného výskytu škodlivých organismů – držíme se intervalu v tabulce. **Proti přezimujícím škůdcům** ošetřujeme při rašení, rostliny aplikáční kapalinou dokonale smočíme, aby se dostala do prasklin borky, za šupiny pupenů apod., kde se vajíčka škůdců nachází. **U amerického padlí angreštového na angreštu** ošetřujeme 1x před květem a následně 2-4x po odkvětu v intervalu 7-14 dní (dle počasí a infekčního tlaku), **u rybízu** ošetřujeme až po odkvětu ve stejném intervalu i počtu ošetření. **Proti padlí u révy** ošetřujeme poprvé před květem a pak až 5x v intervalu 7-14 dní dle ohrožení porostu, náchylnosti odrůdy, dispozice lokality a vhodnosti počasí pro patogena. Po ošetření okrasných rostlin **proti červcům** doporučujeme rostliny druhý den opláchnout čistou vodou. U chmele proti plísni je optimální ošetřovat opakovaně v období červen-srpen v intervalu 14 dní.

Příprava aplikáční kapaliny:

Před vlastním použitím ponechte Rock Effect NEW alespoň 12 hodin temperovat při pokojové teplotě a pro přípravu aplikáční kapaliny použijte vodu o pokojové teplotě, protože se jedná o olejový pomocný prostředek. Důvodem je houstnutí pomocného prostředku při nízkých teplotách. Potřebné množství pomocného prostředku odměřte až po důkladném protřepání obsahu originálního obalu. Odměřené množství rozmíchejte v předepsaném množství vody v nádrži aplikáčního zařízení. Mírný pohyb nádrže při aplikaci udržuje emulzi aplikáční kapaliny stále stabilní.

Čištění zařízení pro aplikaci pomocného prostředku:

Ohned po aplikaci pomocného prostředku vypláchněte nádrž, rozvod kapalinu a trysku čistou vodou. Zbytek oplachové vody vystříkejte na ošetřovanou plochu a celá zařízení znovu propláchněte čistou vodou. V případě použití čisticích prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

POMOCNÝ PROSTŘEDEK NA OCHRANU ROSTLIN PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘILOŽENÝ NÁVOD K POUŽITÍ.

Rock Effect NEW

Postřikový pomocný prostředek k podpoře zdravotního stavu rostlin ve formě emulgovatelného koncentráту určený pro zvýšení odolnosti a obranyschopnosti rostlin vůči škůdcům a vůči americkému padlí angreštovému a padlí.

Balení pro neprofesionální uživatele

Název a množství účinné složky: olej z *Pongamia pinnata* 496,9 g/l (cca 56 hm.%)

• **UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. • ZAMEZTE VDECHOVÁNÍ MLHY / AEROSOLŮ.**

• **POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE / OCHRANNÝ ODĚV.**

• **DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ, ABYSTE SE VYVAROVALI RIZIK PRO LIDSKÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.**

• **NEZNEČIŠŤUJTE VODY POMOCNÝM PROSTŘEDKEM NEBO JEHO OBALEM. (NEČIŠŤEJTE APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ V BLÍZKOSTI POVRCHOVÝCH VOD / ZABRAŇTE KONTAMINACI VOD SPLACHEM Z FAREM A Z CEST).**

Držitel povolení / osoba odpovědná za konečné balení a označení:

AGRO CS a.s., č.p. 265, 552 03 Říkov, tel: 491 457 111

Evidenční číslo pomocného prostředku: 1859-OC

Číslo šarže / Datum výroby formulace: uvedeno na vnitřním nebo vnějším obalu

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při správném skladování v původních neporušených obalech.

Množství pomocného prostředku v obalu: HDPE nebo PET láhev s pomocným prostředkem v množství 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml a 1 l

Způsob působení:

Aplikací pomocného prostředku se ošetřeným rostlinám zlepší jejich zdravotní stav a zvýší odolnost vůči škůdcům a chorobám. Přítomnost pomocného prostředku na rostlinách také v důsledku protipožerového efektu sníží zájem škůdců o ošetřené rostliny, na škůdce působí i fyzikálně. U houbových chorob účinkuje olej jako mechanická bariéra průniku hub do rostlin.

Návod k použití/rozsah povoleného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL, 4) k dávkování 5) k Umístění, 6) k Určení sklizně
zelenina, okrasné rostliny (prostorové kultury)	zvýšení odolnosti rostlin	1-2 % (100-200 ml /10 l vody)	-	2) mšice, molice, třásněnky, při ohrožení porostů, případně při prvním výskytu, 4) do počátku skautí, 5) venkovní prostory, chráněné prostory
zelenina, okrasné rostliny (plošné kultury)	zvýšení odolnosti rostlin	1-2 % (100-200 ml /10 l vody/100 m ²)	-	2) mšice, molice, třásněnky, při ohrožení porostů, případně při prvním výskytu, 5) venkovní prostory, chráněné prostory
zelenina, okrasné rostliny (prostorové kultury)	zvýšení odolnosti rostlin	0,5-1 % (50-100 ml /10 l vody)	-	2) svlušky, při ohrožení porostů, případně při prvním výskytu, 4) do počátku skautí, 5) venkovní prostory, chráněné prostory
zelenina, okrasné rostliny (plošné kultury)	zvýšení odolnosti rostlin	0,5-1 % (50-100 ml /10 l vody/100 m ²)	-	2) svlušky, při ohrožení porostů, případně při prvním výskytu, 5) venkovní prostory, chráněné prostory
zelenina, okrasné rostliny (prostorové kultury)	zvýšení odolnosti rostlin	1 % (100 ml /10 l vody)	-	2) padlí, při ohrožení porostů, případně při prvním výskytu, 4) do počátku skautí, 5) venkovní prostory, chráněné prostory
zelenina, okrasné rostliny (plošné kultury)	zvýšení odolnosti rostlin	1 % (100 ml /10 l vody/100 m ²)	-	2) padlí, při ohrožení porostů, případně při prvním výskytu, 5) venkovní prostory, chráněné prostory
okrasné rostliny (prostorové kultury)	zvýšení odolnosti rostlin	2-3 % (200-300 ml /10 l vody)	-	2) červci, při ohrožení porostů, případně při prvním výskytu, 4) do počátku skautí, 5) venkovní prostory, chráněné prostory

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL, 4) k dávkování 5) k Umístění, 6) k Určení sklizně
okrasné rostliny (plošné kultury)	zvýšení odolnosti rostlin	2-3 % (200-300 ml /10 l vody/100 m ²)	-	2) červci, při ohrožení porostů, případně při prvním výskytu, 5) venkovní prostory, chráněné prostory
ovocné dřeviny, bobuloviny, réva	zvýšení odolnosti rostlin	1-2 % (100-200 ml /10 l vody)	-	2) mšice, při ohrožení porostů, případně při prvním výskytu, 4) do počátku skautí, 5) venkovní prostory
ovocné dřeviny, bobuloviny, réva	zvýšení odolnosti rostlin	0,5-1 % (50-100 ml /10 l vody)	-	2) svlušky, při ohrožení porostů, případně při prvním výskytu, 4) do počátku skautí, 5) venkovní prostory
ovocné dřeviny, okrasné dřeviny, bobuloviny, réva	zvýšení odolnosti rostlin	3 % (300 ml /10 l vody)	-	2) přezimující škůdci, mery, při rašení, 4) do počátku skautí, 5) venkovní prostory
ovocné dřeviny, bobuloviny, réva	zvýšení odolnosti rostlin	1 % (100 ml /10 l vody)	-	2) padlí, při ohrožení porostů, případně při prvním výskytu, 4) do počátku skautí, 5) venkovní prostory
angrešt, rybíz	zvýšení odolnosti rostlin	1 % (100 ml /10 l vody)	-	2) americké padlí angreštové, při ohrožení porostů, 4) do počátku skautí, 5) venkovní prostory
chmel	zvýšení odolnosti rostlin	1 % (200 ml /20 l vody)	-	2) plíseň chmele, při ohrožení porostů, 4) do počátku skautí, 5) venkovní prostory
chmel	zvýšení odolnosti rostlin	0,5-1 % (100-200 ml /20 l vody)	-	2) svlušky, při ohrožení porostů, 4) do počátku skautí, 5) venkovní prostory
chmel	zvýšení odolnosti rostlin	1-2 % (200-400 ml /20 l vody)	-	2) mšice, při ohrožení porostů, 4) do počátku skautí, 5) venkovní prostory

(-) - ochrannou lhůtu (OL) není nutné stanovit.

Upřesnění použití:**Návod na použití:**

Nižší koncentrace aplikační kapaliny v rámci uvedeného rozmezí jsou vhodné pro mladší rostliny, vyšší koncentrace pro starší rostliny a při vyšším napadení rostlin škodlivými organismy. Pomocný prostředek se nedoporučuje používat na velmi mladé rostliny. Před ošetřením rostlin ověřte citlivost na menším počtu rostlin nebo na menší ploše. Postřik či rosení prostorových kultur ukončete při dokonalém ovhčení, nejpozději při počínajícím skautí aplikační kapaliny z povrchu ošetřovaných částí rostlin. Dávka pro plošné kultury je stanovena pro celoplošné použití, pokud se ošetřuje nezapojený porost se širokým mezířadím, je třeba přizpůsobit dávkování skutečně ošetřované ploše.

Plodina, oblast použití	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
zelenina, okrasné rostliny, ovocné dřeviny, bobuloviny, réva, angrešt, rybíz, chmel	postřik, rosení	není omezen	7-14 dnů
ovocné dřeviny, bobuloviny, réva, okrasné dřeviny	postřik, rosení	1x za rok na přezimující škůdce	

Další omezení:

Obal s pomocným prostředkem je třeba před použitím důkladně protřepat. Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čochy. Nejezte, nepijte a nekuřte při práci a až do odložení osobních ochranných prostředků. Prostředek lze aplikovat ručně (ručními nebo zářovými postřikovači). Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Postřik (ve venkovních prostorách) provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Postřik (ve vnitřních prostorách) provádějte bez přítomnosti dalších osob. Po ukončení práce opusťte ošetřované plochy nebo prostory. Po skončení ruční aplikace a po odložení osobních ochranných prostředků (OOP) se umyjte. Po skončení práce kontaminovaný oděv a další OOP vyperte/očistěte. Prostředek uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a případně krmiv. Vstup na ošetřené pozemek/záhon je možný až po zaschnutí postřiku. Vstup do ošetřeného skleníku/fóliovníku je možný nejdříve po 2 hodinách po aplikaci a po důkladném vyvětrání skleníku.

Při ošetřování okrasných rostlin v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel je třeba dodržovat následující preventivní a režimová opatření:

- pomocný prostředek aplikujte v době, kdy je nejmenší (ideálně žádný) pohyb dalších osob na ploše,
- postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Osobní ochranné prostředky:

Ochrana dýchacích	orgánů není nutná
Ochrana rukou	gumové nebo plastové rukavice
Ochrana očí a obličeje	není nutná
Ochrana těla	pracovní oděv, při aplikaci na vyšší plodiny doplněný o nepromokavý plášť nebo turistickou pláštěnku