

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN
PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘILOŽENÝ NÁVOD K POUŽITÍ.

Magnicur Core

Fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí k ochraně jabloně, révy vinné a okrasných rostlin proti houbovým chorobám.
Pro neprofesionální použití.

| | |
|---------------------------------------|--|
| Název a množství účinné látky: | trifloxystrobin 500 g/kg (50 % hmot.) |
|---------------------------------------|--|



| | |
|--|--|
| VAROVÁNÍ | |
| H317 | Může vyvolat alergickou kožní reakci. |
| H410 | Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. |
| P102 | Uchovávejte mimo dosah dětí. |
| P280 | Používejte ochranné rukavice a ochranný oděv. |
| P333+P313 | Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. |
| P501 | Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. |
| | |
| EUH401 | Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. |
| SP1 | Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest). |
| SPe 3 | Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením ochranného pásma 6 m vzhledem k povrchové vodě. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod. |
| SPo 5 | Před opětovným vstupem ošetřené prostory/skleníky důkladně vyvětrejte. |
| | |
| Držitel povolení: | SBM Développement S.A.S. 60 Chemin des Mouilles 691 30 Ecully Francie |
| Právní zástupce: | SBM Life Science s.r.o. Bucharova 2657/12 158 00 Praha 5 |
| Osoba odpovědná za konečné balení a označení nebo za konečné označení přípravku na ochranu rostlin: | |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Evidenční číslo přípravku: | 4403-12 |
| Číslo šarže: | vedeno na obalu |
| Datum výroby formulace: | vedeno na obalu |

| | |
|----------------------------|---|
| Doba použitelnosti: | 2 roky od data výroby při dodržení stanovených podmínek skladování v neporušených obalech (teplota skladování: +5 °C až +30 °C) |
|----------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| Množství přípravku v obalu: | 1,5 g, 15 g až 100 g v LDPE/Al/LDPE/papír sáčku 1,5 g, 15 g v PET/Al/PE sáčku (Balení je opatřeno odměrkou) |
|------------------------------------|---|

Způsob působení

Magnicur Core je fungicid ze skupiny strobilurinů. Vlivem pohybu par dochází k dobrému rozptřeni a ukládání přípravku na rostlinném povrchu. Trifloxystrobin zabraňuje klíčení spor a růstu mycelia hub na povrchu rostlin. Inhibuje také vývoj patogenů v povrchových vrstvách rostlinných tkání.

Návod k použití

Dělitelná balení:

| 1) Plodina, oblast použití | 2) Škodlivý organismus, jiný účel použití | Dávkování, mísitelnost | OL (dny) | Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL | 4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně |
|----------------------------|---|--|----------|--|--|
| jabloň | strupovitost jabloně, padlí jabloňové | 0,015 % (1,5 g/10 l vody) | 14 | | 4) do počátku skanutí |
| réva | padlí révové | 0,0125-0,015 % (1,25 g-1,5 g/10 l vody) | 35 | | 4) do počátku skanutí |

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Jednorázová balení:

| 1) Plodina, oblast použití | 2) Škodlivý organismus, jiný účel použití | Dávkování, mísitelnost | OL (dny) | Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL | 4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně |
|----------------------------|---|--|----------|--|--|
| jabloň | strupovitost jabloně, padlí jabloňové | 0,015 % (1,5 g/10 l vody) | 14 | | 4) do počátku skanutí |
| réva | padlí révové | 0,0125-0,015 % (1,5 g/10-12 l vody) | 35 | | 4) do počátku skanutí |

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

| Plodina, oblast použití | Způsob aplikace | Max. počet aplikací v plodině | Interval mezi aplikacemi |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|
| jabloň, réva | postřik, rosení | 3x/rok | 10 dnů |

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení ES

| 1) Plodina, oblast použití | 2) Škodlivý organismus, jiný účel použití | Dávkování, mísitelnost | OL (dny) | Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL | 4) Pozn. k dávkování 5) k umístění 6) k určení sklizně |
|----------------------------|---|------------------------------|----------|--|--|
| okrasné rostliny | skvrnitost listů, rzi, padlí | 0,015 % (1,5 g/10 l vody) | - | 2) preventivně, při prvním výskytu | 4) do počátku skanutí 5) venkovní prostory, skleníky |

(-) ochrannou lhůtu není nutné stanovit

| Plodina, oblast použití | Způsob aplikace | Max. počet aplikací v plodině | Interval mezi aplikacemi |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|
| okrasné rostliny | postřik, rosení | 3x/rok | 10 dnů |

Druhová a odrůdová citlivost: není známa. Před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost na malém vzorku rostlin v daných podmínkách.

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na ochranu zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí

Při aplikaci na ovocné stromy:

SPe 3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením ochranného pásma 6 m vzhledem k povrchové vodě.

Další omezení

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.

Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne.

Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy.

Vstup na ošetřený pozemek je možný až druhý den po aplikaci.

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

Práce s přípravkem je nevhodná pro alergické osoby.

Práce s přípravkem je nevhodná pro těhotné a kojící ženy a mladistvé.

Příprava aplikační kapaliny

Uvedeno v bodu: Další údaje a upřesnění.

Čištění zařízení pro aplikaci přípravku

Uvedeno v bodu: Další údaje a upřesnění.

Osobní ochranné pracovní prostředky

Osobní pracovní prostředky při přípravě a aplikaci

Ochrana dýchacích orgánů: není nutná.

Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice.

Ochrana očí a obličeje: při aplikaci postřikem směrem dolů není nutná;

ochranné brýle nebo obličejový štít v případě ručního postřiku – ve výšce obličeje nebo směrem nahoru.

Ochrana těla: ochranný oděv a nepromokavý plášť nebo turistickou pláštěnka.

Dodatečná ochrana hlavy: kapuce, čepice se štítkem nebo klobouk v případě ručního postřiku – ve výšce obličeje nebo směrem nahoru.

Dodatečná ochrana nohou: gumové nebo plastové holínky (s ohledem na práci v zahrádkářském terénu).

Poškozené ochranné prostředky (např. protřžené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.

Informace o první pomoci

Všeobecné pokyny: Projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (podráždění kůže nebo podezření na alergickou reakci) nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku, příbalového letáku nebo bezpečnostního listu.

Při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušete práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast. Zajistěte tělesný i duševní klid.

Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte důkladně pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte.

Při zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a současně vyplachujte oči při široce rozevřených víčkách velkým množstvím vlažné tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat.

Při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení.

Při vyhledávání lékařské pomoci informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem, **telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.**

Skladování

Skladujte v originálních neporušených obalech odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotách +5 °C až +30 °C. Chraňte před přímým slunečním svitem a vlhkem.

Likvidace obalů a zbytků

Obal přípravku se nesmí znovu použít k jakémukoliv účelu. Použité obaly a nepoužitelné zbytky přípravku se odstraňují jako nebezpečný odpad, např. uložením do vyčleněných kontejnerů na místech vyhrazených obecními nebo městskými úřady. Případné zbytkové množství aplikační kapaliny zředěte v poměru 1 : 5 a poté vystříkejte na naposledy ošetřovanou plochu.

Další údaje a upřesnění

Přípravky, u nichž prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že jejich chemické a fyzikální vlastnosti se shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbor přípravku pro tento účel zajistí držitel povolení u laboratoře akreditované v členském státě Evropské unie. Držitel povolení je povinen prodlouženou dobu použitelnosti vyznačit na obalu přípravku a tuto skutečnost oznámit Ústavu do 5 dnů ode dne provedení změny na obalu přípravku.

Technika aplikace

Přípravek Magnicur Core se aplikuje postřikovači, případně rosiči.

Při aplikaci je nutné použít dostatečné množství aplikační kapaliny, aby byla dosažena rovnoměrná pokryvnost, nesmí však dojít ke skapávání přípravku z povrchu ošetřených rostlin (do počátku skanutí).

Vyšší dávky aplikační kapaliny jsou vhodné pro ošetření vyšších a hustších porostů, resp. s velkou plochou zelené hmoty.

Upozornění: ošetřovaný porost nesmí být v době aplikace vlhký v důsledku rosy nebo předchozích dešťových srážek. Během 2 hodin po aplikaci by nemělo pršet.

Nedoporučujeme aplikovat v poledne v době nejintenzivnějšího slunečního svitu a vysokých teplot. Aplikace nesmí zasáhnout sousední necílové porosty!

Příprava aplikační kapaliny

Odměřenou dávku přípravku vsypte do nádrže postřikovače předem naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání doplňte na stanovený objem. Připravenou postřikovou kapalinu bezodkladně spotřebujte.

Čištění zařízení pro aplikaci přípravku

Postřikovač po aplikaci důkladně vypláchněte vodou (3x) a výplachovou kapalinu poté vystříkejte na naposledy ošetřovanou plochu.

Dotatková informace společnosti SBM Développement S.A.S.:

Jabloň - skládkové choroby:

Aplikace v období po ukončení kvetení om

ezuje výskyt skládkových chorob, zejména hnědé kruhové

hniloby (Pezicula spp.). Pozdní aplikace (28 dní až 14 dní před sklizní) jsou účinné proti skládkovým chorobám, zejména skládkové strupovitosti jabloň (Venturia inaequalis), hnědé kruhové (Pezicula spp.) a peniciliové (Penicillium spp.) hnilobě plodů.

Réva vinná - černá hniloba, červená spála, plíseň révová, černá skvrnitost, šedá hniloba, bílá hniloba:

Dle zkušeností společnosti SBM Développement S.A.S. přípravek Magnicur Core v dávce 0,015 % současně působí i proti černé hnilobě a červené spále révy vinné a má také podstatnou vedlejší účinnost proti plísni révové, černé skvrnitosti, šedé hnilobě a bílé hnilobě.

***Přípravek používejte výhradně v souladu s návodem k použití.
Přípravek nesmí být používán v takových dávkách a kombinacích, které nejsou uvedeny v textu etikety anebo nejsou součástí písemných doporučení společnosti SBM Développement S.A.S., platných pro aplikaci dodávaných přípravků na ochranu rostlin.
V případě použití jakékoliv kombinace předem odzkoušejte vzájemnou mísitelnost jednotlivých zamýšlených složek.
Společnost SBM Développement S.A.S. nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím či skladováním přípravku.***



PROHOTOPO.CZ