



## Přípravek na ochranu rostlin – balení pro neprofesionální použití

# Mogeton<sup>®</sup> 25 WP

Selektivní herbicid ve formě smáčitelného prášku proti jätrovce v květináčích i kontejnerových kulturách a proti mechům v okrasných, užitkových, sportovních a golfových trávnicích pro aplikaci závlivkou nebo postřikem.

<b>Účinná látka:</b>	quinclamine 250 g/kg, tj. 2-amino-3-chloro-1,4-naftochinon
<p><b>Pozor!</b></p>  <p><b>Zdraví škodlivý</b></p>  <p><b>Nebezpečný pro životní prostředí</b></p>	<p>R 48/22: Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním.</p> <p>R 43: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.</p> <p>R 63: Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky.</p> <p>R 50/53: Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.</p> <p>S 2: Uchovávejte mimo dosah dětí.</p> <p>S 13: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.</p> <p>S 20/21: Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.</p> <p>S 22: Nevdechujte prach.</p> <p>S 28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.</p> <p>S 35: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn bezpečným způsobem.</p> <p>S 36/37: Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.</p> <p>S 46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.</p> <p>S 61: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.</p> <p>Pravidelná práce s přípravkem je nevhodná pro alergiky, protože obsahuje senzibilující látku.</p> <p>Trvalá práce s přípravkem je zakázána těhotným a kojícím, dále mladistvým.</p> <p>SP1: Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem /Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.</p> <p>OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. St. zdrojů povrchové vody.</p> <p>Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.</p> <p>Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.</p>

**Registrační číslo:** 4500-1

**Držitel rozhodnutí o registraci:** LOVELA Terezín s.r.o., Budínek 80, 263 01 Svaté Pole

**Výrobce přípravku:** Stähler International GmbH & Co. KG, Stader Elbstrasse, D-21683 Stade, Německo

**Balí a dodává:** LOVELA Terezín s.r.o., provozovna: 28. října 62, 411 55 Terezín, tel. 416 782 224

**Datum výroby a číslo šarže:** uvedeny na obalu

<sup>®</sup> je registrovaná ochranná známka firmy Stähler International GmbH & Co., KG, Německo

Doba použitelnosti: Při dodržení podmínek skladování v neporušených originálních obalech je doba použitelnosti přípravku 2 roky od data výroby.

Působení

## Etiketa Mogeton 25 WP

Vytvořeno 5. 12. 2005,

poslední korektura dne 6. 11. 2012

Přípravek se vstřebává přes nadzemní části rostlin, mech se zbarvuje dožluta a odumírá. Mogeton® 25 WP zůstává přítomen v půdě a po dobu 2-4 měsíců brání růstu mechu. Trávník není následkem aplikace přípravku nijak poškozen, na zahradních cestách a dlážděných plochách nezůstává žádné trvalé zabarvení.

### Spektrum účinnosti

Přípravek Mogeton® 25 WP účinkuje velmi dobře na rokyt cypřišovitý (*Hypnum cupressiforme*), měřík příbuzný (*Mnium affine*), ploník chluponosný (*Polytrichum piliferum*), kostrbatec zelený (*Rhytidiadelphus spuarrosus*).

### Návod k použití

Plodina	Škodlivý činitel	Dávka (koncentrace)	OL	Poznámka
trávníky	mechy	15g / 1 l / 10m <sup>2</sup>	2 dny	postřik
trávníky	mechy	15g / 10 l / 10m <sup>2</sup>	2 dny	zálivka
kontejnerové kultury	játrovky	15g / 1 l / 10m <sup>2</sup>	AT	postřik

Poznámka: Množství 1g přípravku odpovídá objemu vrchovatě naplněné větší přiložené lžičky.

AT – jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžaduje.

Přípravek lze použít pouze 1x v roce.

Zákaz zkrmování ošetřené trávy.

Po dobu 2 dní po ošetření zamezit vstupu osob nebo domácích zvířat na ošetřenou plochu.

### Poznámky k aplikaci:

Aplikace se provádí nejlépe při teplém a vlhkém počasí, při zatažené obloze od května do září. Zlepšení účinku a snížení rizika poškození rostlin lze dosáhnout dodatečnou zálivkou 1-2 l vody/m<sup>2</sup>, kdy dojde k omytí povrchu rostlin a smytí přípravku k mechům.

Nově zatravněné plochy neošetřujeme v roce výsevu.

Vzhledem k velkému počtu druhů a odrůd okrasných rostlin nelze vyloučit rozdílné snášenlivosti. Doporučujeme proto před postřikem celé plochy zkontrolovat citlivost jednotlivých rostlin za stávajících podmínek růstu.

Při použití postřikem je nezbytné použít k omezení úletu postřikové kapaliny herbicidní kryt!

Přípravek aplikujte pozemně postřikem nebo zálivkou.

Postřik nesmí zasáhnout sousední porosty.

### Příprava postřikové - zálivkové kapaliny

Odvážené množství přípravku nejprve dokonale rozmícháme v pomocné nádobě s malým množstvím vody na řídkou kaši, která se potom za stálého míchání vlije do nádrže aplikátoru naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se doplní vodou na požadovaný objem.

### Čištění aplikačního zařízení

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Veškeré stopy přípravku Mogeton® 25 WP musí být z aplikačního zařízení odstraněny ihned po skončení postřiku/zálivky podle následujícího postupu:

- 1) Po vyprázdnění vypláchněte zařízení čistou vodou (čtvrtinou jeho objemu).
- 2) Poté zařízení znovu vypláchněte čistou vodou (čtvrtinou jeho objemu), případně s přídavkem čistícího prostředku. V případě použití čistících prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.
- 3) Opakujte postup dle bodu "2" ještě jednou.

### Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí

Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptáků, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a mikroorganismů a necílových rostlin.

Přípravek je vysoce toxický pro vodní organismy.

Způsob likvidace obalů a neupotřebitelných zbytků

Případné zbytky oplachové kapaliny nebo aplikační jíchy se zředí vodou v poměru 1:5 a beze zbytku vystříkají na předtím ošetřenou plochu. Nesmí však zasáhnout zdroje vod podzemních ani recipienty vod povrchových. Obal přípravku se nesmí znovu použít k jakémukoliv účelu. Případné zbytky přípravku a použité obaly se likvidují jako nebezpečný odpad, např. uložením do vyčleněných kontejnerů na místech vyhrazených obecními nebo městskými úřady.

Podmínky správného skladování:

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách od +5 °C do +30 °C odděleně od potravin, nápojů a krmiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chránit před mrazem, ohněm, vysokou teplotou, vlhkem a přímým slunečním svitem.

Bezpečnostní opatření

Před použitím si přečtěte si přiložené pokyny.

Ucpané trysky se nesmějí profukovat ústy.

Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 minut během 1 dne.

Přípravek lze aplikovat výhradně při použití krytu trysky zaručujícího 99% redukci úletu (platí pro aplikaci postřikem).

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tomto případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory!

Aplikaci na veřejně přístupných plochách je třeba předem oznámit (např. místně příslušnému obecnímu úřadu nebo městskému úřadu). Vlastník pozemku nebo osoby/firmy provádějící aplikaci musí zajistit zákaz vstupu nepovolaným osobám na ošetřovanou plochu během aplikace.

Vlastník pozemku nebo osoby/firmy provádějící aplikaci dále musí zajistit vhodné označení ošetřené plochy (po dobu 2 dní po aplikaci) nápisem: Chemicky ošetřeno, nevstupujte na trávník. Po dobu 2 dní zamezit pohybu domácích zvířat na ošetřené ploše. Vstup na ošetřené plochy je možný až 2 dny po aplikaci.

Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky) a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte resp. očistěte (ty OOPP, které nelze prát, důkladně očistěte/umyjte alespoň teplou vodou a mýdlem/pracím práškem).

U textilních prostředků se při jejich praní/ošetřování/čištění řiďte piktogramy/symboly, umístěnými zpravidla přímo na výrobku.

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

Osobní ochranné prostředky (OOPP) při přípravě aplikační kapaliny a aplikaci přípravku:

Ochrana dýchacích orgánů: není nutná

Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice

Ochrana očí a obličeje: není nutná

Ochrana těla: pracovní oděv z textilního materiálu, nejlépe označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“

Dodatečná ochrana hlavy: není nutná

Dodatečná ochrana nohou: gumové nebo plastové holinky (s ohledem na práci v zemědělském nebo zahrádkářském terénu)

Společný údaj k OOPP: poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.

První pomoc

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku/příbalového letáku.

První pomoc při nadýchání aerosolu: Přerušete expozici a zajistěte tělesný i duševní klid. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.

První pomoc při zasažení kůže prachem: Setřepete granule/prach z oděvu a pokožky. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.

## Etiketa Mogeton 25 WP

Vytvořeno 5. 12. 2005,

poslední korektura dne 6. 11. 2012

První pomoc při zasažení kůže roztokem: Odložte nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.

První pomoc při zasažení očí: Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a současně vyplachujte prostor pod víčky po dobu alespoň 10 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky (zasažené přípravkem) nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat.

První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.



PROHOPo.cz