

CYTROL DUST

insekticidní popraš



- **ÚČINNÝ**
Rychlý "knockdown" a dlouhotrvající účinek při nízkých aplikačních dávkách.
- **SNADNO POUŽITELNÝ**
Aplikuje se přímo z foukačky nebo poprašovači.
- **VŠESTRANNÝ**
Působí na mastném i lakovaném povrchu.
- **NEZÁVADNÝ**
Bez organických rozpouštědel na bázi přírodních nosičů.

účinná látka: cypermethrin

CYTROL DUST

pro profesionály i širokou veřejnost

Insekticidní širokospektrý popraš narůžovělé barvy na bázi přírodních nosičů (mstek, mouka, kaolin). Působící jako dotykový a požerový jed i proti skrytě žijícím škůdcům. Hmyz, který není zahuben ihned, je schopen ještě odnést popraš na svém těle do kolonie, a tím kontaminovat další jedince.

PROTI KTERÝM ŠKŮDCŮM PŘÍPRAVEK POUŽÍVÁME

Obtížný lezoucí a létající hmyz:

mravenci, vosy, švábovití, blechy, cvrčci, rybenky, pisivky, mouchy, masačky, klíšťata, moli, kožojedi aj.

Skladištní škůdci:

pilousi, potemníci, lesáci, korovníci a další.



KDE PŘÍPRAVEK POUŽÍVÁME

V domácnostech, skládkách, veřejných i stravovacích budovách, sklepích, technických a skladovacích prostorách, sila, sýpky, k ochraně muzejních preparátů a sbírek aj., kde není možné provést postřik např. přípravky Cimetro, Vulcan Super EC, Bandit Super 10 EW (profesionální použití) jako např. elektrická instalace, teplovodní kanály, prostředí s vysokou prašností.

Napadená místa či místa možného výskytu (i jako prevence) rovnoměrně poprašujeme (dávka se pohybuje od 2 - 6 gramů na m²). Popraš neaplikujeme na místa, která se používají k přípravě jídel (např. kuchyňské linky) nebo kde se odkládá kuchyňské nádobí. Je nutné zabránit kontaminaci potravin a krmiv.

Vyšší aplikační dávku používáme např. na skládkách, v jatkách apod.



JAKÝM ZPŮSOBEM PŘÍPRAVEK POUŽÍVÁME

Popraš aplikujeme přímo z plastového obalu (foukačky) nebo poprašovači při použití 1 kg plastových dóz.

Proti lezoucímu hmyzu:

rovnoměrně poprašíme místa výskytu a jejich přístupové cesty do vnitřních prostor budov dávkou 1-2 g/m².

Proti létajícímu hmyzu:

aplikujeme v místech největšího výskytu jako jsou skládky, místa, kde usedají vosy a jejich okolí, praskliny, škvíry, podlahy na jatkách, stravovacích zařízeních apod. Rovnoměrně poprašíme tato místa dávkou 1-2 g/m². Vyšší dávku použijeme na skládkách.

Proti skladištním škůdcům:


Přípravek je účinný na všechna vývojová stadia (kromě roztočů) v dávce 2-6 g/m².

Ochrana muzejních preparátů a sbírek proti obtížnému hmyzu dávkou 1-2 g/m².

Cytrol Dust je povolen pro použití v potravinářských provozech na základě povolení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv ze dne 2.10.2009 pod čj. 82/2009.

Před použitím vždy důkladně přečtěte celý text etikety s návodem na použití.

V případě nutnosti si vyžádejte bezpečnostní list k přípravku u dodavatele nebo na www.pelgar.cz



info@pelgar.cz
www.pelgar.cz

BALENÍ

Pro malospotřebitelský sektor je přípravek dodáván ve **150 gramových plastových foukačkách** (v přepravním kartonu je 30 foukaček) pro profesionální použití baleno v **1 kg plastových dozách** (9 dóz v přepravním balení)

CYTROL je registrovaná obchodní známka PelGar International Ltd., Velká Británie.