

ZDRAVÁ BROSKEV

Souprava dvou fungicidů k ošetření broskvoně proti kadeřavosti listů.

OBSAH SOUPRAVY : KUPRIKOL 50: 2 x 30 g + THIRAM GRANUFLO: 1 x 15 g

BLOK OŠETŘENÍ: 1. ošetření - na jaře při nalévání pupenů **KUPRIKOL 50: 30 g / 5 l vody**
2. ošetření - ve fázi rašení až růžový pupen **THIRAM GRANUFLO: 15 g / 5 L vody** (ošetření později než v době kvetení jsou již z pravidla neúčinná)
3. ošetření - na podzim po opadu listů **KUPRIKOL 50: 30 g / 5 L vody** (Toto ošetření se provádí pro omezení přezimování choroby na stromech)

Návod na použití	Přípravek na ochranu rostlin Balení pro neprofesionální uživatele	Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.										
<p>KUPRIKOL 50</p> <p>Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.</p>	<p>Funkce přípravku: Fungicid Úprava: smáčitelný prášek (WP) Hořlavost: přípravek není hořlavý</p> <p>Fungicidní přípravek ve formě smáčitelného prášku k ochraně proti houbovým a bakteriálním chorobám rostlin.</p> <p>Účinná látka: oxichlorid mědi 84% (obsah kovové mědi 50%)</p> <p><u>Označení přípravku z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí:</u> Sp1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. /Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody. / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.</p> <p>Přípravek je pro řasy toxický. Přípravek je pro živočichy sloužící rybám za potravu vysoce toxický. Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany zvířete. Přípravek z hlediska ochrany včel nevyžaduje klasifikaci.</p> <p>Přípravek se nesmí používat pro jiné účely a v jiném rozsahu, než je uvedeno v tomto návodu k použití.</p>	<p>Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Ošetřené prostory (jako zahradní skleník nebo fóliovník) před opětovným vstupem důkladně vyvětrejte. Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin. Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.</p> <p>Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) při přípravě aplikační kapaliny a aplikaci:</p> <p>Ochrana dýchacích orgánů: není nutná Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice Ochrana očí a obličeje: není nutná Ochrana těla: pracovní oděv z textilního materiálu, a nepromokavý plášť s kapuci (turistická pláštěnka) Dodatečná ochrana hlavy: není nutná Dodatečná ochrana nohou: gumové nebo plastové holínky Poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně vyměnit.</p> <p>Informace o první pomoci při zasažení člověka přípravkem: Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku/příbalového letáku. Při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc, zajistěte lékařské ošetření. Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou, pokožku dobře opláchněte. Při zasažení očí: Nejméně 15 minut vyplachujte-zejména prostory pod víčky-čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou. Při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou, nevyvolávejte zvracení. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku. Při vyhledání lékařského ošetření, informujte lékaře o přípravku se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.</p>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="38 662 257 686">1) plodina, oblast použití</th> <th data-bbox="257 662 571 686">2) škodlivý organismus, jiný účel použití</th> <th data-bbox="571 662 862 686">dávkování, mísitelnost</th> <th data-bbox="862 662 929 686">OL</th> <th data-bbox="929 662 1108 686">3) poznámky</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="38 686 257 1125">broskvoň</td> <td data-bbox="257 686 571 1125">kadeřavost listů</td> <td data-bbox="571 686 862 1125">30 g / 5 L vody</td> <td data-bbox="862 686 929 1125">-</td> <td data-bbox="929 686 1108 1125">při nalévání pupenů</td> </tr> </tbody> </table>	1) plodina, oblast použití	2) škodlivý organismus, jiný účel použití	dávkování, mísitelnost	OL	3) poznámky	broskvoň	kadeřavost listů	30 g / 5 L vody	-	při nalévání pupenů	<p>OL - ochranná lhůta je minimální interval ve dnech mezi posledním ošetřením a sklizní ošetřené kultury. AT – Jde o určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžaduje, od doby ošetření po sklizeň uběhne dostatečně dlouhá doba.</p> <p>Čištění aplikačního zařízení: Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikem, musí být veškeré jeho stopy z mísicích nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Po vypuštění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou po dobu alespoň 10 minut. Zbytek oplachové vody vypustte a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou s přidavkem čistícího prostředku (postupujte dle návodu na jeho použití). Opakujte postup podle bodu „2“ ještě jednou. Trysky a sítky musí být čišťeny odděleně. <p>Příprava aplikační kapaliny: Odměřené množství přípravku vsypte a stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Používejte dokonale čisté aplikační zařízení.</p> <p>Další údaje z hlediska ochrany zdraví lidí: Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 minut během 1 dne.</p>	<p>Skladování : Přípravek skladujte pouze v uzavřených originálních a neporušených obalech v chladu, v dobře větratelných a uzavřených skladech, odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, hořavin, léků, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě +5 až +30 C. Chraňte před vlhkem, mrazem, sáláním tepelných zdrojů a přímým slunečním zářením.</p> <p>Způsob likvidace obalů a neupotřebitelných zbytků: Při likvidaci zbytků a použitých obalů nesmějí být zasaženy zdroje spodních a recipienty povrchových vod. <u>Aplikační kapalinu spotřebujte beze zbytku.</u> Obaly od přípravku se nesmějí znovu používat k jakýmkoliv účelům! Případné zbytky přípravku, prázdné obaly a oplachové vody se likvidují jako nebezpečný odpad uložením do vyčleněných kontejnerů na místech vyhrazených k tomuto účelu obecními nebo městskými úřady. Použitě nářadí, nástroje, zařízení a ochranné pomůcky se omyjí se vodou.</p> <p>Upozornění: Riziko za poškození vyplývající z použití přípravku jinak než jak je uvedeno v této etiketě nese spotřebitel. Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí. Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbor přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.</p>
1) plodina, oblast použití	2) škodlivý organismus, jiný účel použití	dávkování, mísitelnost	OL	3) poznámky								
broskvoň	kadeřavost listů	30 g / 5 L vody	-	při nalévání pupenů								

Návod na použití

THIRAM GRANUFLO

Před použitím si přečtěte příložený návod k použití.

Přípravek na ochranu rostlin
Balení pro neprofesionální uživatele.

Funkce přípravku: fungicid
Úprava: ve vodě dispergovatelné granule (WG)

Fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí určený k ochraně rostlin proti houbovým chorobám.

Účinná látka: thiram 800 g/kg (80%)

Tuhá látka s možností samovznícení po vzlhnutí.

Nebezpečí samovznícení při styku s kyselinami a látkami uvolňujícími kyselou sloučeninu.

Sp1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Necházejte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

SPe3 Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5m od okraje ošetřovaného pozemku.

Při aplikaci do sadů:

Spe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržáním neošetřené ochranné pásma 10 m vzhledem k povrchové vodě.

Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů a necílových rostlin.

Působení přípravku:

Účinná látka thiram patří do skupiny dithiokarbamátů a příbuzných přípravků. Účinkuje kontaktně a preventivně. Působí vícebodově. Není ohrožena rezistencí.

Přípravek se nesmí používat pro jiné účely a v jiném rozsahu, než je uvedeno v tomto návodu k použití.

rozsah registrovaného použití:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	poznámka
Broskvoň	kadeřavost broskvoně	15 g / 5 L vody	42	max. 3x za rok, postřik, rosení

OL - ochranná lhůta je minimální interval ve dnech mezi posledním ošetřením a sklizní ošetřené kultury.

Postřik (rosení) ukončíme při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.

Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny!

Nižší dávka z uvedeného rozmezí v řevě se použije při ošetření před výskytem, při nižším ohrožení porostu a při kratším intervalu mezi ošetřeními.

Broskvoň:

Proti kadeřavosti broskvoně se doporučuje preventivní ošetření na podzim po opadu listů a dále pak na konci zimy ve fázi nalévání pupenů a pak ve stádiu růžových pupenů. Pokud je růst opožděný v důsledku nevhodných povětrnostních podmínek, opakujte postřik v průběhu kvetení (max. 3 aplikace za rok).

Doporučený objem aplikační kapaliny 2 – 10 L vody / 100 m²

Příprava aplikační kapaliny:

Odměřené množství přípravku vsypte za stálého míchání do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou a doplňte na stanovený objem. Aplikační kapalinu použijte bezprostředně po přípravě. Používejte dokonale čisté aplikační zařízení.

Čištění aplikačního zařízení:

Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných postřikem, musí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a postřikovače odstraněny ihned po skončení postřiku podle následujícího postupu:

- Po vypuštění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou po dobu alespoň 10 minut.
- Zbytek oplachové vody vypusťte a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou s přidávkou čistícího prostředku (postupujte dle návodu na jeho použití).
- Opakujte postup podle bodu „2“ ještě jednou.
- Trysky a sítko musí být čišťeny odděleně.

Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě a aplikaci :

Ochrana dýchacích orgánů: není nutná
Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice
Ochrana očí a obličeje: není nutná
Ochrana těla: celkový ochranný oděv (popř. při aplikaci ve výškách v sadech nepromokavý plášť s kapucí nebo turistická pláštěnka)
není nutná
Dodatečná ochrana hlavy: pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holinky) s ohledem na práci v zemědělském terénu.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.

Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne.

Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy.

Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí nejzte, nepijte a nekuřte. Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte resp. očistěte (ty OOPP, které nelze prát, důkladně očistěte/umyjte alespoň teplou vodou a mýdlem/pracím práškem).

U textilních prostředků se při jejich prání/ošetřování/čištění řiďte piktogramy/symboly, umístěnými zpravidla přímo na výrobku.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod.

Informace o první pomoci při zasažení člověka přípravkem ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 547/2011:

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uveďte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku/příbalového letáku.

První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici a zajistěte tělesný i duševní klid. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc.

První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

První pomoc při zasažení očí: Při otevřených víčkách vyplachujte – zejména prostory pod víčky - čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou. Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, pálení) vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské ošetření).

První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí); nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování:

Přípravek se skladuje v originálních neporušených obalech v suchých skladech odděleně od potravin, krmiv, hnojiv a dezinfekčních prostředků při teplotách + 5 až + 20 °C. Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a vlhkem! Tuhá látka s možností samovznícení po vzlhnutí. Nebezpečí samovznícení při styku s kyselinami a látkami uvolňujícími kyselou sloučeninu. Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a vlhkem!

Způsob likvidace obalů a neupotřebitelných zbytků:

Při likvidaci zbytků a použitých obalů nesmějí být zasaženy zdroje spodních a recipienty povrchových vod.

Aplikační kapalinu spotřebujte beze zbytku.

Obaly od přípravku se nesmějí znovu používat k jakýmkoliv účelům!

Případné zbytky přípravku, prázdné obaly a oplachové vody se likvidují jako nebezpečný odpad uložením do vyčleněných kontejnerů na místech vyhrazených k tomuto účelu obecními nebo městskými úřady.

Použitá nářadí, nástroje, zařízení a ochranné pomůcky se omyjí se vodou.

Upozornění:

Riziko za poškození vyplývající z použití přípravku jinak než jak je uvedeno v této etiketě nese spotřebitel.

Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbor přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře pro přípravky na ochranu rostlin a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.