

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI APLIKACI RODENTICIDŮ:

Při práci není dovoleno jít, pít nebo kouřit. Během práce používejte osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám – EN374 a kožené nebo gumové boty). Při zasažení pokožky a po použití přípravku a před jídlem se důkladně omyjte teplou vodou a mydlem.

PŘÍZNAKY OTRAVY:

Krátké po požití nevolnosti, zvracení. Po několika hodinách až dnech kvárcení do pokožky a sliznic, tvorba modřin, močení krve, krvavá stoliečka, kvárcení z nosu a dásni.

PRVNÍ POMOC:

Při náhodném požití: Vypláchnout ústa čistou vodou.

Nevyválat zvracení!

Nikdy nepodávat nic ústy osobě v bezvědomí.

Okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat tento příbalový letáček.

V případě požití nástrahy domácím zvířetem kontaktujte veterinárního lékaře.

Při zasažení pokožky: odstranit zasažený oděv, důkladně omyt zasaženou pokožku teckoucí vodou a mydlem.

Při zasažení očí: držte oko/ocí otevřené a vyplachujte proudem čisté teckoucí vody po dobu nejméně 5-10 minut. V případě přetrávavajícího podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

Při nadýchaném prachu: přerušit práci s nástrahou, opustit zamořený prostor, nepohybujat se.

Postiženého vždy předat k lékařskému ošetření s informací o poskytnuté první pomoci. **ANTIDOTEM** proti působení brodifakumu je vitamín K1. Jeho dávku vždy určí zdravotní či veterinární pracovník.

Telefonní čísla pro naléhavé případy:

Toxikologické informační středisko

Klinika nemocí z povolání VFN v Praze

a 1. lékařské fakulty UK

Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

Telefon: 22491 9293, 2491 5402 - nepřetržitě

SKLADOVÁNÍ PŘÍPRAVKU:

Skládajte přípravek na suchém, chladném a dobré větratelném místě, a to v původních neporušených obalech odděleném od potravin, krmiv, hnojiv a různých aromatických látek včetně pesticidů, aby nástrahy nepřejaly zápar, čímž by mohly ztratit svoji atraktivitu pro hlodavce. Skládajte na místech mimo dosah dětí, ptáků a hospodářských zvířat při teplotě 5-35 °C. Nástrahy chráněte před přímým slunečním světlem a vlhkem.

LIKVIDACE OBALŮ:

Prázdné soudky, foliévé sáčky a pytle - po důkladném vyplácení – znehodnotte a likvidujte v komunálním odpadu, v souladu s místními požadavky.

DOBA POUŽITELNOSTI: Při předepsaném způsobu skladování je doba použitelnosti minimálně 2 roky od data výroby.

Hmotnost: 5 kg, 10 kg, 20 kg

Číslo výrobní šarže/datum výroby: uvedeno na obalu

Bezpečnostní list k přípravku je k dispozici u dodavatele přípravku, výrobce nebo www.pelgar.cz

DRŽITEL POVOLENÍ:

PelGar International Ltd.
Unit 13, Newmame Lane, ALTON
GU34 2QR Hampshire, Velká Británie
www.pelgar.co.uk

DODAVATEL:

PelGar s.r.o., Na Výsluni 2424/7, 100 00 Praha 10
Telefon: 608 923 215, 602 219 959,
274 770 944
E-mail: info@pelgar.cz, www.pelgar.cz

VÝROBCE:

Rodenticidy Norat 25 zrní profi a Norat 25 G profi
pro PelGar s.r.o. vyrábí a balí
Agrochema, družstvo, 675 02 Studenec č. 195

Povolení Ministerstva zdravotnictví ČR:

Název přípravku:

CZ-0018939-0000 (15529/2018/SOZ)

Norat 25 zrní profi (25 ppm)

CZ-0018871-0000 (1398/2018/SOZ)

Norat 25 G profi (25 ppm)

CZ-2015-0010 (28207/2017/SOZ)

Norat H profi (25 ppm)

CZ-2015-0009 (37346/2017/SOZ)

Norat ATG profi (25 ppm)

CZ-2014-0010 (27037/2017/SOZ)

Norat G (50 ppm)

NORAT je registrovanou ochrannou známkou
PelGar International Ltd., Velká Británie

Příbalový leták k rodenticidním přípravkům

NORAT 25 zrní profi NORAT 25 G profi



**Biocidní přípravky
podle §5 zákona
č. 324/2016 Sb.**

**Rodenticidní požerové
nástrahy k přímému použití
pouze profesionály a odborně
způsobilými osobami**

Norat 25 zrní profi Ize použit i v kanalizacích!

SLOŽENÍ: Účinná látka 0,0025% hm. brodifakum (25 mg v 1 kg nástrahy) tj.: 3-[3-(4'-bromobifenylyl)-4]-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftylyl-4-hydroxy-2H-chromen-2-on
ES číslo: 259-980-5 CAS číslo: 56073-10-0
0,001% – denatonium benzoát (hořké činidlo)
99,994% – atraktívní návnadový materiál (obilí, atraktanty, pojiva aj.)

Přípravek obsahuje hořké činidlo zmírňující riziko nežádoucího požití člověkem a pigmentové barvivo.

VAROVÁNÍ:

- Může způsobit poškození krevní srážlivosti při prodloužené nebo opakovanej expoziči.
- Obsahuje 1, 2-benzisothiazolin-3-one. Může vyvolat alergickou reakci (platí pouze pro Norat 25 zrní)

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:

- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nevděchujte prach.
- Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad předaním oprávněné osobě.

MECHANISMUS ŪČINKU:

Brodifakum patří mezi antikoagulační jedy. Po požití snižuje srážlivost krve, zvyšuje prostupnost krevních cest a zasažený hlodavec hyne na vnitřní vykrvácení. Vzhledem k opožděnímu působení jsou nástrahy účinné až po 4-10 dnech po požití.

Nástrahy nevyvolávají obranný reflex.

DÁVKOVÁNÍ (na 1 deratizační staničku nebo noru):

Myš domácí (dospělec) 5 - 20 g

Potkan obecný (dospělec): 10 - 60 g

Požerové nástrahy ve formě zrní a granulí (25 G) pro hubení škodlivých hlodavců – myši domácí (*Mus musculus*) a potkan obecného (*Rattus norvegicus*) – jednorázovým příjemem – ve vnitřních a venkovních prostorách.

Vzdálenost vykládání nástrah:

Myš domácí (*Mus musculus*): 5-20 g nástrahy na jednu deratizační staničku nebo noru. Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 2 metry, při vysokém zaměření 5 metrů.

Potkan domácí (*Rattus norvegicus*): 10-60 g nástrahy na jednu deratizační staničku nebo noru. Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 5 metrů, při vysokém zaměření 2 metry.

KANALIZACE – hubení potkanů (platí pouze pro použití Norat 25 zrní profi):

200-300 g zrn na každých 30-50 metrů (ne více než 300 g do jedné díry).

**OBECNÁ PRAVIDLA / POKYNY PRO POUŽITÍ
RODENTICIDNÍCH NÁSTRAH UVNITŘ A VENKOVNÍCH PROSTORECH V OKOLÍ BUDOV
A OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ RIZIK**

Před použitím přípravku si přečtěte veškeré dostupné informace a říde se danými pokyny.

Před deratizační akcí provedte průzkum zamořené oblasti a posouzení na místě, určete druh hlodavců, místa jejich aktivity a stanovte pravděpodobnou příčinu a rozsah zamoření. Zvažte rovněž alternativní regulaci hlodavců pomocí pastí.

Pokud je to možné, informujte před zahájením deratizace případné osoby/instituce o plánované deratizaci hlodavců a seznamte je s případnou první pomocí.

Postupujte podle metodických pokynů pro provádění ochranné deratizace vydaných podle § 80 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Deratizace použitím jedových staniček:

Deratizační nebo jedové staničky musí být opatřeny těmito informacemi:

Název přípravku, účinná látka a text: *Nepoužívejte a neotevírejte jedové staničky, v případě nehody volejte Toxikologické informační centrum – 224 919 293, 224 915 402.*

Nástrahu je zapotřebí zajistit tak, aby ji nebylo možné z deratizační staničky vytáhnout.

Staničky by měly být umístěny v bezprostřední blízkosti míst, kde byla již dříve zaznamenána aktivity hlodavců (např. stezky, hnidiště, výkrymy, díry, nory apod.)

Neumísťujte staničky v blízkosti drenážních systémů a kanalizaci, kde mohou přijít do styku s vodou.

Nástrahy umísťujte do staničky pomocí dávkovacího zařízení. Je nutné pracovat v rukavicích, a to nejen z hygienického hlediska, ale také kvůli pavoučové stopě, která by hlodavce mohla odražovat od konzumace nástrahy.

Umísťujte nástrahy mimo dosah dětí a nečilových organismů (ptáci, domácí i hospodářská zvířata).

Neumísťujte nástrahy v blízkosti potravin, nápojů a krmiv, ani nástrojů nebo povrchů, které s nimi přicházejí do kontaktu.

Odstraňte potraviny snadno dosažitelné pro hlodavce (rozsypané zrní nebo potravinový odpad aj.). Kromě této opatření zaměřenou oblast nečistěte, aby populace hlodavců nebyla vyrušena a omezena akceptace nástrahy, a tím navozen pocit bezpečí pro její pohodlnou konzumaci.

Mezi jednotlivými aplikacemi neomývajte deratizační staničky, ani náční používejte v zakrytých a chráněných místech s nástrahou.

Přípravek se nesmí používat déle než 35 dnů bez vyhodnocení stavu zamorení a účinnosti deratizace.

Pokud je konzumace nástrahy vzhledem k výskytu hlodavců nízká, přenechte staničky na jiné místo **nebo použijte jiný typ nástrahy Norat s brodifakem** (např. již autorizované využívané nástrahy Norat ATG profi, Norat H profi, Norat G (0,005%) profi nebo pak na autorizaci stále „čekající“ pastu nebo bloky).

Je-li nástraha zkonzumována úplně, je efektivní zvýšit počet míst, nikoliv navýšení množství na daném místě.

V případě podezření na nedostatečnou účinnost přípravku či zjistění rezistence (pokud i po 35 dnech je stále pozorována aktivity hlodavců), vyzádejte si radu dodavatele přípravku nebo se obrátte na deratizační službu.

Pro zabránění rezistence nepoužívejte střídavě různé antikoagulantry se srovnatelnou nebo slabší účinností nebo aplikujete jiný typ rodenticidu.

Přípravek by měl být používán pouze jako součást systému integrované ochrany proti škůdcům, která zahrnuje např. hygienická opatření, a pokud je to možné, i fyzikální metody regulace.

Zvažte preventivní kontrolní opatření (ucpěte díry, odstraňte případné potraviny a nápoje co nejdále) s cílem zvýšit příjem přípravku a snížit pravděpodobnost opětovného zamorení.

Pro deratizaci využijte výhod zimního období, kdy nutriční požadavky hlodavců jsou vyšší (pro udržení jejich tělesné teploty), a proto se stahují k obydlim za potravou.

Nepoužívejte rodenticidy jako trvalou nástrahu k prevenci zamorení hlodavci či sledování jejich aktivity.

Na konci deratizační akce odstraňte zbytky přípravku a deratizační staničky, v souladu s místními zákony.

Při likvidaci uhynulých hlodavců a nástrah nacházejících se mimo deratizační staničky používejte např. kleště. Nedotýkejte se uhynulých hlodavců (hlodavci mohou přenášet onemocnění).

Uhynulé hlodavce likvidujte jako nebezpečný odpad předáním do spalovny s osvědčením opravňujícím k likvidaci nebezpečného odpadu.

Evropský katalog odpadů:

20 01 21 Pesticidy

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

VYŠKOLENÍ PROFESIONÁLOVÉ – hubení myší domácí a potkana obecného

Vnitřní prostory - viz výše uvedená pravidla

Deratizační staničky je nutno kontrolovat nejméně každé 2-3 dny v počáteční fázi deratizace u myší domáci. U potkana obecného kontrolovat nejdříve za 5-7 dnů. Následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, deratizační staničky neporušená a za účelem odstranění uhynulých hlodavců.

V případě potřeby (pokud byla stanička poškozena vodou nebo kontaminována nečistotami), vyměňte nástrahu.

Postupujte podle případných dalších pokynů uvedených v příslušném kodexu osvědčených postupů.

Délka ošetření nesmí přesáhnout 35 dní.

Venkovní prostory kolem budov – viz výše uvedená pravidla

Při venkovní použití musí být nástraha umístěna tak, aby byl minimalizován kontakt nečilových organismů s nástrahou a nebezpečí požití (děti, ptáci, zvířata).

Pro snížení rizik sekundární otravy, vyhledejte a odstraňte uhynulé hlodavce v souladu s doporučenými uvedenými ve Standardní metodice ochranné deratizace.

Nepoužívejte přípravek k deratizaci formou trvalé a pulzační aplikace.

ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY – hubení myší domácí a potkana obecného

Vnitřní prostory - viz výše uvedená pravidla

Nástraha se aplikuje buď do deratizačních staniček nebo na krytá místa chráněná přístupu nečilových organismů, poskytujících stejnou úroveň ochrany pro nečilové druhy a pro člověka jako deratizační staničky.

Deratizační staničky je nutno kontrolovat nejméně každé 2-3 dny v počáteční fázi deratizace u myší domáci a následně pak nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, deratizační staničky neporušená a za účelem odstranění uhynulých hlodavců. U potkana obecného kontrolovat nejdříve za 5-7 dnů. Následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizační staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců

Pokud se používá k hubení hlodavců pulzační metoda aplikace nástrah, nahrazujte zkonzumovanou nástrahu až po 3 dnech a pak maximálně v sedmidenních intervalech.

Venkovní prostory – viz výše uvedená obecná pravidla a pokyny

Nástraha se aplikuje buď do deratizačních staniček nebo na krytá místa chráněná přístupu nečilových organismů, poskytujících stejnou úroveň ochrany pro nečilové druhy a pro člověka jako deratizační staničky.

Nástraha musí být umístěna tak, aby se minimalizoval kontakt nečilových organismů s nástrahou a nebezpečí požití (děti, ptáci, zvířata).

Zakryjte nebo zablokujte vchody do nor s nástrahou za účelem snížení nebezpečí, že nástrahy nebudou

akceptovány hlodavci nebo dojde k jejímu roznesení z místa aplikace. Tímto postupem je zamezen necilovým druhům přístup k nástraze, naopak cílovým druhům – hlodavcům – je takto poskytnut pocit bezpečí pro pohodlnou konzumaci nástrahy.

V případě deratizační akce v městských aglomeracích je nutné před akcí provést důkladnou očistu areálu ve smyslu odstranění volně dostupných potravinových zdrojů. Ošetřené areály se označí výstražními nápisů. Nástrahy kontrolujeme a případně doplňujeme i během prvních 8-10 dní, a to tak dlouho, pokud trvá jejich odběr.

Pulzační metoda – rozmístění nástrah v malém množství na více míst, a to i tam, kde je předpokládán největší výskyt hlodavců, tj. do děr, nor, skryší atd. Nahrazujte zkonzumovanou nástrahu po 3 dnech a pak maximálně v sedmidenních intervalech. Odstraňte rozsypanou nástrahu a uhynulé hlodavce.

Chraňte nástrahy před vlivem povětrnostních podmínek (sníh, dešť apod.)

Při umístování deratizačních staniček nebo nástrahových bodů v blízkosti povrchových vod např. řek, rybníků, vodních kanaálů, hrází, zavlažovacích nádrží) nebo drenážních systémů, zajistěte, aby nedocházelo ke styku nástrahy s vodou.

Neaplikujte nástrahu v místech, kde hrozí záplavy.

Vyměřte nástrahu, pokud byla poškozena vodou nebo kontaminována nečistotami.

Nepoužívejte přípravek jako stálou nástrahu k prevenci zamorení hlodavci či sledování jejich aktivity.

Na konci deratizační akce odstraňte zbytky přípravku a deratizační staničky, v souladu s místními zákony.

Při likvidaci uhynulých hlodavců a nástrah nacházejících se mimo deratizační staničky používejte např. kleště. Nedotýkejte se uhynulých hlodavců.

POUŽITÍ NÁSTRAH V KANALIZACÍCH (platí pouze pro Norat 25 zrní profi):

Umistujte nástrahy pouze do kanalizačních systémů, které jsou napojeny na cisternu odpadních vod.

Nástraha musí být aplikována tak, aby nepršel do styku s vodou a nebyly odplaveny.

Nepoužívejte přípravek k deratizaci formou pulzační aplikace nástrahy.

Frekvenční kontroly odběru nástrahy by měla být v souladu s doporučeními stanovenými v příslušném kodexu osvědčených postupů.