

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN
Morsuvin New Formulation®
Repelentní přípravek k ochraně lesních kultur proti okusu zvěří v době vegetačního klidu

Biologická funkce přípravku: repelent Formulační úprava: pasta PA

NÁZEV A MNOŽSTVÍ ÚČINNÉ LÁTKY: křemenný písek 260 g.kg⁻¹ (26%),
destilační zbytky tuku 40 g.kg⁻¹ (4%), (vše v % hmotnostních)

Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv.

Při aplikaci nepoužívejte kontaktní čočky. Osobám alergickým se nedoporučuje práce s přípravkem.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci

SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem (nečistěte aplikační zařízení v blízkosti
povrchových vod / zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).

Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo vrácením dodavateli. Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití

Výrobce, držitel povolení, osoba odpovědná za konečné balení a označení: NeraAgro, spol. s r.o., Ul. Práce 657,

277 11 Neratovice, ČR, IČ 26133733, tel.: 315 663 181, E-mail: info@neraagro.cz

Evidenční číslo přípravku: 1142–4

Datum výroby a číslo šarže:

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby v původních obalech při dodržení
skladovacích podmínek; teplota skladování +5°C až +30°C

Množství přípravku v obalu: 6 kg

ÚDAJE O VÝROBKU: Morsuvin je pastovitá nerozpustná směs repelentních chuťových a čichových látek přírodního
původu k ochraně lesních kultur - sazenic jehličnanů a listnáčů - proti okusu zvěří v době vegetačního klidu.

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
jehličnany sazenice, listnaté dřeviny sazenice	ochrana proti zimnímu okusu zvěří	4-5 kg / 1000 ks sazenic do 2 let stáří	AT		5) venkovní prostory
jehličnany sazenice, listnaté dřeviny sazenice	ochrana proti zimnímu okusu zvěří	5-6 kg / 1000 ks sazenic starších 2 let	AT		5) venkovní prostory

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
jehličnany, listnaté dřeviny	ředění 10:0,5 (přípravek/voda)	nátěr	1x za rok



ZPŮSOB APLIKACE:

Přípravek se aplikuje ručně nátěrem kmínků a silnějších větévek (u listnatých dřevin), posledního přeslenu s terminálním výhonem (u jehličnanů) pomocí kartáče nebo rukavice.

TERMÍN APLIKACE:

Jehličnany se ošetřují po úplném zdřevnatění výhonů, listnaté dřeviny se ošetřují po zežloutnutí nebo opadu listů. Ošetření se neprovádí za deště a teplot pod +2 °C.

JINÁ OPATŘENÍ:

Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.

DALŠÍ ÚDAJE:

Na spotřebu má vliv velikost ošetřovaných sazenic. Aplikace nelze provádět při teplotách nižších než +4 °C a na namrzlém povrchu dřevin. Po ošetření musí přípravek alespoň částečně zaschnout, aby nebyl splaven deštěm. Správně aplikovaný přípravek zajišťuje ochranu proti okusu zvěří 6 – 7 měsíců. Před aplikací nesmí být přípravek vystaven vyšší teplotě než je maximální teplota skladování (zákaz přímého rychlého ohřevu zdroji tepla o vyšší teplotě). Přípravek lze aplikovat ručně nátěrem – speciálním kartáčem, případně rukou chráněnou odolnou rukavicí.

OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PŘI PŘÍPRAVĚ A APLIKACI

Ochrana dýchacích orgánů není nutná

Ochrana rukou vhodné ochranné rukavice odolné proti mechanickým rizikům

Ochrana očí a obličeje není nutná

Ochrana těla pracovní oděv (nezbytná podmínka - oděv musí mít dlouhé rukávy a nohavice)

Dodatečná ochrana hlavy není nutná

Dodatečná ochrana nohou uzavřená obuv (např. gumová nebo plastové holínky)

Společný údaj k OOPP poškozené OOPP (např. protřžené rukavice) je třeba urychleně vyměnit

Zamezte styku přípravku s kůží. Při práci používejte doporučené osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). Nejezte, nepijte a nekuřte při práci a až do odložení OOPP. Po skončení ruční aplikace a po odložení OOPP se důkladně umyjte. Po skončení práce ochranný/pracovní oděv a další OOPP vyperte / očistěte. Vstup na ošetřený pozemek je možný po zaschnutí nátěru. Při přípravě aplikační kapaliny nepoužívejte kontaktní čočky. Přípravek uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a případně krmiv.

INFORMACE O PRVNÍ POMOCI

Všeobecné pokyny:

Projeví-li se zdravotní potíže, nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.

První pomoc při nadýchání: Přerušete práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.

První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem.

První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím, pokud možno vlažné čisté vody. Má-li osoba kontaktní čočky, vyjměte je, pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Kontaktní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat.

První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyměňujte zvracení.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

PODMÍNKY SPRÁVNÉHO SKLADOVÁNÍ

Morsuvin se skladuje v originálních nepoškozených obalech v suchých, uzamčených skladech odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, hořavin, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek, při teplotě od +5 °C do +30 °C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním svitem. Stejně podmínky dodržujte při přepravě a použití přípravku.

ZPŮSOB LIKVIDACE OBALU A NEUPOTŘEBITELNÉHO ZBYTKU

Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí mohou předat k recyklaci do sběru. Pokud se nepodaří obaly řádně vyčistit, spálí se ve schválené spalovně vybavené dvojestupňovým spalováním s teplotou 1200 –1400 °C ve druhém stupni a s čištěním plyných zplodin. Oplachové vody lze použít na ředění dalšího Morsuvinu pokud možno v místě aplikace přípravku. Případné zbytky přípravku se po nasáknutí do hořlavého materiálu (piliny) spálí ve spalovně stejných parametrů jako obaly. Obaly se zaschlými zbytky přípravku lze vyčistit mechanicky jemnou deformací PP kbelíku, kdy většina přilepeného zbytku přípravku z deformovaných stěn opadá. S takto vzniklým materiálem se zachází stejně jako s ostatními zbytky přípravku.

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbor přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře pro přípravky na ochranu rostlin a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku.

Výrobce bere záruku za kvalitu výrobku ve smyslu platné PN. Protože však okus zvěří je ovlivňován řadou vnějších vlivů, jako dostupností potravy, sněhovou pokrývkou, zazvěřením, zdravotním stavem zvěře apod., neručí za eventuální poškození ošetřených kultur zvěří. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

UFI: M910-D0VA-W00V-RGRX

® ochranná známka NeraAgro, spol. s r.o. Neratovice